

EXPUESTOS A HEPATITIS C: (AGREGADO POR DIANA)

Personal sanitario: enfermeros, médicos, laboratoristas y cirujanos por pinchazos accidentales con agujas o cortes con elementos cortopunzantes.

Pacientes en diálisis: personas sometidas a tratamientos prolongados de hemodiálisis en centros asistenciales.

Receptores de transfusiones o trasplantes: pacientes que recibieron derivados sanguíneos u órganos antes de la implementación de controles universales obligatorios en los bancos de sangre.

EXPUESTOS A VIRUS AMARÍLICOS:

Los vectores principales de la fiebre amarilla son los mosquitos de los géneros ***Aedes***, ***Haemagogus*** y ***Sabethes***.

En las ciudades, el vector principal es ***Aedes aegypti***, mientras que en las selvas y bosques tropicales predominan las especies silvestres del género ***Haemagogus*** y ***Sabethes***

Personal sanitario: todo el personal sanitario se encuentra expuesto en zona de existencia del vector y al tratar pacientes que estén infectados, se genera el ciclo de contagio, puesto que si el mosquito pica a un paciente infectado y luego a personal de salud, el contagio es probable.

Deben tomarse medidas en los locales de internación: uso de mallas mosquiteras en ventanas, insecticidas aprobados, cierre y control hermético de salas de internación de pacientes infectados por virus amarílicos (puertas dobles, filtros sanitarios, otros).

PROTECCIÓN DEL PERSONAL: vacunación obligatoria.