

Código 60019 – Trypanosoma cruzi

ENFERMEDAD DE CHAGAS

¿Qué es la Enfermedad de Chagas?

Es una infección parasitaria causada por el protozoo *Trypanosoma cruzi*.



Código 60019

La Resolución SRT 81/2019 incluye la infección por Trypanosoma cruzi dentro del listado de enfermedades profesionales.


Actividades laborales relacionadas

- Trabajos rurales.
- Actividades agrícolas.
- Trabajos en viviendas precarias rurales.
- Investigación biológica.
- Laboratorios.
- Control de plagas.

Agente Causal

Trypanosoma cruzi

- Es un protozoo parásito.
- Vive en la sangre y tejidos de animales y personas infectadas.
- Produce una infección aguda y una fase crónica.
- Puede permanecer en el organismo durante toda la vida.



¿Quién transmite la enfermedad?

Vēctor principal

Reservorios

- Humanos.
- Perros.
- Gatos.
- Armadillos.
- Roedores.
- Zarigüeyas y otros mamíferos silvestres.

La vinchuca se infecta al alimentarse de sangre de animales o personas infectadas.

¿Cómo se transmite?

Vía vectorial (principal)

La vinchuca pica para alimentarse y luego elimina heces contaminadas con el parásito cerca de la picadura.

La infección ocurre cuando las heces ingresan por la piel lesionada, ojos o boca.

Otras vías

- Congénita (madre-hijo).
- Transfusiones.
- Trasplantes.
- Accidentes de laboratorio.
- Alimentos contaminados.

Animales susceptibles

La infección puede encontrarse en:

- Perros.
- Gatos.
- Armadillos.
- Roedores.
- Zarigüeyas.
- Murciélagos.
- Mamíferos silvestres.

Estos animales pueden actuar como reservorios del parásito.

Manifestaciones clínicas

— — —

Los animales pueden presentar:

- Debilidad.
- Pérdida de peso.
- Intolerancia al ejercicio.
- Alteraciones cardíacas.
- Muerte súbita en casos severos.

Muchos reservorios permanecen asintomáticos.



Síntomas en humanos

— — —

Fase aguda

- Puede presentar:
- Fiebre.
- Cansancio.
- Dolor de cabeza.
- Dolores musculares.
- Inflamación en el sitio de entrada.
- Signo de Romaña (hinchazón del párpado).



Complicaciones a largo plazo

— — —

Fase crónica

Años después de la infección pueden aparecer:

- Cardíacas
- Arritmias.
- Insuficiencia cardíaca.
- Cardiomegalia.
- Muerte súbita.

Digestivas

- Megaesófago.
- Megacolon.

¿Quiénes están en riesgo?

Ámbito rural

- **Trabajadores agrícolas.**
- **Productores ganaderos.**
- **Personal de viviendas rurales.**
- **Trabajadores forestales.**

Otras actividades

- **Técnicos de control vectorial.**
- **Veterinarios.**
- **Investigadores.**
- **Personal de laboratorio.**

Identificación del riesgo

Riesgo biológico

Peligro

Exposición al parásito
Trypanosoma cruzi.

Factores de riesgo

- Presencia de vinchucas.
- Viviendas precarias.
- Ambientes rurales endémicos.
- Falta de control vectorial.

Consecuencias

- Enfermedad aguda.
- Enfermedad crónica.
- Compromiso cardíaco irreversible.

Prevención en el trabajo

— — —

Control ambiental

- Eliminación de vinchucas.
- Mejoramiento de viviendas.
- Sellado de grietas y techos.

Medidas organizacionales

- Capacitación.
- Vigilancia epidemiológica.
- Reporte de casos sospechosos.

EPP

- Guantes.
- Ropa de trabajo.
- Protección durante tareas de fumigación.

Prevención, tratamiento y seguimiento

— — —

Prevención en humanos

- Diagnóstico temprano.
- Controles médicos periódicos.
- Educación sanitaria.

Tratamiento

Se utilizan medicamentos antiparasitarios, especialmente efectivos en etapas tempranas.

Seguimiento

- Controles cardiológicos.
- Estudios digestivos.
- Seguimiento por ART cuando corresponda.

Conclusiones

— — —

- La enfermedad de Chagas es una zoonosis causada por *Trypanosoma cruzi*.
- La principal vía de transmisión es la vinchuca.
- Los trabajadores rurales constituyen uno de los grupos más expuestos.
- El control vectorial es la medida preventiva más importante.
- El diagnóstico precoz disminuye el riesgo de complicaciones graves.
- La vigilancia sanitaria y la educación son fundamentales para la prevención.